

Mundskylning / kompres med Tranexamsyre ved blødning

Til patienter og pårørende

Efter operation i mundhulen kan blødning forekomme. Ved blødning bør du først forsøge med gazekompres og kulde. Hvis dette ikke stopper blødningen, kan du anvende Tranexamsyre mundskyl, som du har fået udleveret.

Det kan anvendes på 2 måder. Du skal gøre som aftalt med tandlægen.

Mundskylning

En ampul (10 ml) med Tranexamsyre åbnes, hældes i munden og blandingen fordeles rundt i 2 minutter. Spyttes ud efterfølgende. Der skylles 4 x dagligt i 2-3 dage. Undlad at drikke noget den første time efter skylning.

Gazekompres

En ampul åbnes og sterile gaze krøller gennemvædes med Tranexamsyre. En gaze krølle placeres på det blødende område og fastholdes med hårdt sammenbid i 30 minutter. Behandlingen kan gentages ved manglende effekt. En ampul kan bruges til 2-3 gaze krøller. Ampullen opbevares under 25° i køleskab efter åbning.

Hvis blødningen stadig ikke ophører,

Kontakt Kæbekirurgisk ambulatorium på telefon 79 18 21 45, hverdage kl. 8.00 - 15.00.

Er du udskrevet fra Planlagt Kirurgi kan du rette henvendelse hertil mandag - torsdag indtil kl. 17.30 på telefon 79 18 30 08. Fredage indtil kl 16.30.

Uden for ovennævnte åbningstider kan du de første 24 timer efter udskrivelse kontakte afd. E3 på telefon 79 18 21 53. Herefter kontaktes lægevagten. (lægevagten Region Syddanmark 70 11 07 07).

Med venlig hilsen

Kæbekirurgisk Afsnit