

Beroligende medicin

Til patienter og pårørende

Du har fået tilsendt eller udleveret en tablet Halcion a 0,25 mg.

Læs mere om Halcion her: <https://www.apoteket.dk/8cc046cf-0bb8-47e7-8f8c-e71da6becc92>

Du skal tage tabletten som aftalt, før du kommer hos os næste gang.

Du skal tage tabletten 1 1/2 time før mødetidspunktet hos os. Fra du har indtaget tabletten, skal du være sammen med en ledsager.

Kan synkes eller lægges under tungen og opløses.

Virkning:

- Halcion er en tablet, som virker beroligende.
- Du kan derfor føle dig døsig og træt efter, du har taget den.
- Virkningen kan allerede indtræde efter 15-30 minutter, og kan vare 5-8 timer.
- Virkningen kan dog opleves forskelligt.

Tabletten er først helt ude af kroppen efter ca. 12 timer.

Graviditet og amning:

- Hvis du er gravid eller ammer, skal du ikke tage Halcion.

Bilkørsel:

- Du må ikke køre bil, når du har taget Halcion, da tabletten gør dig døsig og træt.
- Du skal derfor have en til at bringe dig til og fra sygehuset og evt. blive hos dig, til du føler dig helt frisk.

Obs:

Halcion bør bruges med forsigtighed, hvis du har nedsat lever- og lungefunktion eller en alvorlig psykiatriske lidelser, herunder depression. Spørg din læge til råds, hvis du er i tvivl.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kæbekirurgisk ambulatorium på tlf. 7918 2145, hverdage mellem 8.00-15.00 .

Med venlig hilsen

Kæbekirurgisk afsnit