

## Anvendelse

Rimstar bruges til behandling af tuberkulose. Dosis udregnes efter vægt.

Lægen har til dig ordineret følgende: \_\_\_\_\_

## Bivirkninger

Der kan forekomme bivirkninger. De mest almindelige er træthed, nedsat appetit, mavesmerter og kvalme, hovedpine, allergiske reaktioner, muskel og ledsmerter, uro og krampe i ben og fødder.

Medicinen tåles sædvanligvis uden komplikationer, men kontakt læge eller ambulatorium ved følgende symptomer:

- Ingen appetit
- Kvalme, opkastninger, mavesmerter
- Gul i øjnene
- Feber
- Hukommelses, eller koncentrationsbesvær
- Humørsvingninger
- Synsforstyrrelser, ændret farvesyn eller nedsat synsevne
- Andre symptomer

## Vær opmærksom på

- Rimstar nedsætter virkningen af metadon.
- Rimstar må ikke tages sammen med Antabus.
- Urin, spyt og tårevæsker farves rødt.
- Det kan være nødvendigt at justere eventuel antiepileptisk behandling ved samtidig behandling med Rimstar.
- Indtagelse af større mængder alkohol frarådes ved behandling med Rimstar.
- Der kan være præparater, der ikke kan tages sammen med Rimstar. Det er derfor vigtigt, at du oplyser lægen om hvilken anden medicin du evt. får.
- P- pillers virkning aftager ved samtidig behandling med Rimstar.

## Sådan skal du tage medicinen

*Medicinen skal tages 1 time før et måltid.*

## Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte Lunge Ambulatorium på telefon 7918 2671 kl. 8.00 - 14.30 på alle hverdage.

Det er bedre, at du ringer eller kommer forbi, end at du selv stopper behandlingen.