

Synacténtest

Til patienter og pårørende

Synacténtest

Formål med testen

At undersøge dine binyres hormonproduktion.

Undersøgelsen varighed

Det tager ca. 45 min.

Forholdsregler før testen

Får du tablet Hydrocortison eller binyrebarkhormon inhallation, skal du holde pause med dette mindst 24 timer forud for testen.

Selve testen

Testen foregår oftest i Diabetes og Hormon Ambulatoriet i Grindsted

Du skal møde i Diabetes og Hormon Ambulatoriet, hvor du af en sygeplejerske vil få lagt en kanyle i en blodåre, herfra kan tages blodprøver og gives medicin.

Der tages en blodprøve, herefter får du synactén (et stof som dannes naturligt i hypofyseforlappen, og som stimulerer binyrenes produktion af cortisol) sprøjtet i kanylen. Efter en 1/2 time vil der blive taget en ny blodprøve, og herefter fjernes kanylen

Bivirkninger

Du kan opleve let varmfølelse, og du kan i yderst sjældne tilfælde få allergiske reaktioner, som vil optræde indenfor en 1/2 time efter medicinen er givet, og altså imens du opholder dig i ambulatoriet.

Svar

Det tager ca. 1 uge før der er svar på testen.

Svaret går til den læge, som har bestilt testen.