

Behandling med Zoledronsyre

Til patienter og pårørende

Hvordan virker Zoledronsyre?

Det forebygger knoglekomplikationer (f.eks. knoglebrud), der skyldes knoglemetastaser eller knoglekræft, eller for at reducere niveauet af calcium i blodet hos patienter, hvis niveauet er for højt.

Bivirkninger

En bivirkning der kaldes for osteonekrose i kæben (ONJ - beskadigelse af knogle i kæbe) er indberettet som en ikke almindelig bivirkning hos patienter, der fik injektioner af Zoledronsyre til behandling af kræftrelaterede sygdomme. ONJ kan opstå, efter at behandlingen er ophørt.

For at nedsætte risikoen for at du får ONJ, er der nogle forsigtighedsregler, du bør følge:

Inden behandlingen starter.

- Bed din læge om at fortælle om ONJ, inden du starter i behandling.
- Spørg lægen om han/hun anbefaler et tandeftersyn, inden du starter i behandling med Zoledronsyre.
- Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med munden eller tænderne.

Patienter der får foretaget tandoperationer (f.eks. tandudtrækninger) som ikke regelmæssigt går til tandlæge eller har en tandkødssygdom, er rygere, som får forskellige kræftbehandlinger eller som tidligere har fået bifosfonater (til behandling af knoglesygdomme), kan have øget risiko for at udvikle ONJ.

Under behandlingen

- Du skal opretholde en god mundhygiejne, sørge for at evt. tandproteser passer rigtigt og jævnlige få foretaget tandeftersyn hos tandlægen.
- Fortæl det til din tandlæge og din læge, at du er i behandling med Zoledronsyre, hvis du får tandbehandling eller skal have en tandoperation.
- Kontakt straks din læge og din tandlæge, hvis du får problemer med munden eller tænderne. F.eks. løse tænder, smerter eller hævelse eller manglende heling af sår eller sekretion, da det kan være tegn på osteonekrose i kæben. Hvis du har spørgsmål til behandlingen er du altid velkommen til at spørge en læge eller sygeplejerske fra afdelingen.