

Scalenerblokada i forbindelse med operation

Til patienter og pårørende

Du har fået lagt en blokade i forbindelse med din skulderoperation.

Formål

At mindske dine smerter efter operationen. Du kan, på trods af blokaden, fortsat opleve at have smerter.

Virkning

Blokaden bliver lagt ved et stik på siden af halsen, der hvor nerverne løber på deres vej mod skulderen/armen. Meningen med dette er at opnå smertelindring. Den smertelindrende effekt varer mellem 12-16 timer. Enkelte gange varer blokaden op til 24 timer. I princippet svarer nerveblokada til en lokalbedøvelse. Nerveblokada bedøver ikke kun de nervegrene, der har at gøre med føle- og smertesansen, men også de nerver som styrer musklernes bevægelighed. Du vil derfor opleve, at din arm føles tung og er helt eller delvis ubevægelig og kan derfor være svær at styre. Brug slyngen du får udleveret. Du skal være opmærksom på, hvordan du har armen liggende, og at den ikke bliver klemt.

Bivirkninger

Blokaden kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger kan forekomme:

- Nedsat hostekraft og hæshed. Nedsat evne til at synke på grund af bedøvelse i halsen.
- Påvirkning af øjet, hængende øjenlåg, tørt øje, pupil forskel.
- Følelse af at være lammet i den side af ansigt og arm, hvor blokaden er lagt.
- I sjældne tilfælde kan der være åndedrætspåvirkning.

Du skal være klar over, at alle bivirkninger er forbigående og fortager sig samtidig med den smertestillende effekt.

Spørg, hvis du er i tvivl

Kontakt Ortopædkirurgisk Afdeling.

Med venlig hilsen

Sydvestjysk Sygehus