

Isoniazid (Исониазид)

Для пациентов и близких

Применение

Исониазид применяют для лечения и профилактического лечения туберкулеза.

Для профилактического лечения туберкулеза принимают Исониазид как самостоятельный антибиотический препарат.

Для полного лечения туберкулеза принимают Исониазид в сочетании с другими антибиотическими препаратами.

Побочные действия

Лечение с помощью Исониазида может вызвать беспокойство и судороги в ногах и стопах. Кроме того может возникнуть головокружение, нарушение концентрации, сыпь на коже и снижение аппетита. Может появиться тошнота и рвота.

Лекарство обычно переносится без осложнений, но следует обратиться к врачу или в амбулаторию при следующих симптомах:

- Отсутствие аппетита
- Тошнота, рвота, боли в животе
- Желтизна в глазах, температура
- Психические проблемы: нарушение памяти, нарушение концентрации, перепады настроения
- Другие побочные действия

Обратите внимание

Может возникнуть необходимость регулировки актуального антиэпилептического лечения при одновременном лечении Исониазидом.

Исониазид нельзя принимать вместе с Антабусом.

Не советуется принимать большое количество алкоголя при лечении Исониазидом.

Могут быть препараты, которые нельзя принимать вместе с Исониазидом. Поэтому важно сообщить врачу какие другие лекарства вы принимаете.

Вопросы

Если у Вас есть вопросы, связанные с лечением, Вы можете связаться с Пульманологической амбулаторией по телефону 7918 2671 с 8.00 до 14.30 по будним дням.

Лучше, если Вы позвоните или придете, чем Вы самостоятельно остановите лечение.