

Rimactan

Til patienter og pårørende

Anvendelse

Rimactan anvendes til behandling og forebyggende behandling af tuberkulose.

Ved forebyggende behandling af tuberkulose tages Rimactan som enkeltstående antibiotisk præparat.

Ved fuld behandling af tuberkulose tages Rimactan i kombination med andre antibiotiske præparater.

Bemærk!

Rimactan skal tages 1/2 - 1 time før et måltid.

Bivirkninger

Rimactan farver urin, afføring og tårer orangerød. Kontaktlinser kan blive misfarvet. Man kan opleve nedsat appetit, træthed, mavegener, hovedpine, svimmelhed, hududslæt.

Medicinen tåles sædvanligvis uden komplikationer, men kontakt læge eller ambulatorium ved følgende symptomer:

- ingen appetit
- kvalme, opkastninger, mavesmerter
- gul i øjnene
- andre bivirkninger

Vær opmærksom på

- Rimactan nedsætter virkningen af metadon.
- Indtagelse af større mængder alkohol frarådes ved behandling med Rimactan.
- P-pillers virkning aftager ved samtidig behandling med Rimactan.
- Det kan være nødvendigt at justere eventuel antiepileptisk behandling ved samtidig behandling med Rimactan.
- Det er vigtigt, at oplyse lægen om, hvad du får af anden medicin, da der kan være præparater, der ikke kan tages sammen med Rimactan.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte Lunge Ambulatorium på telefon 7918 2671 kl. 8.00 - 14.30 på alle hverdage.

Det er bedre, at du ringer eller kommer forbi, end at du selv stopper behandlingen.