

Blokadebehandling omkring et led

Til patienter og pårørende

Du har fået en blokade - en indsprøjtning omkring dit led.

Formål

- Mindske dine smerter og irritation i leddet
- Finde ud af hvor smerterne kommer fra.

Blokaden indeholder en blanding af to slags medicin

- Marcain/Lidokain = smertestillende lokalbedøvelse.
- Depromedrol = binyrebarkhormon i depotform.

Virkning

- Lokalbedøvelsen kan virke 4-6 timer.
- Binyrebarkhormonet giver af og til i løbet af det næste døgn en reaktion i leddet. Det føles som oplussen af smerter og irritation i leddet. Derefter indtræder virkningen gradvist de næste dage og kan holde sig i 4-6 uger, i bedste fald fjerne symptomerne.

Bivirkninger

- Indsprøjtningen har normalt ingen bivirkninger.
- Størstedelen af medicinens indhold fordeles omkring leddet og påvirker sjældent den øvrige del af kroppen.
- Har du sukkersyge kan blodsukkeret påvirkes.

Som en yderst sjælden komplikation kan ses betændelse omkring indstiksstedet.

Vær opmærksom på betændelse

Hvis der opstår betændelse, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen.

Tegn på betændelse:

- Rødme omkring såret
- Feber
- Udtalt hævelse
- Tiltagende smerter/ømhed.

Spørg, hvis du er i tvivl

Kontakt Ortopædkirurgisk Afdeling.

Med venlig hilsen

Sydvestjysk Sygehus