

Информация о туберкулёзе

Для пациентов и близких

Туберкулёз - бактериальная инфекция. Бактерия, в первую очередь, поражает легкие, но может также поражать другие органы, кости и лимфатические узлы. Заразен только туберкулёз легких. Зачастую туберкулёз поражает людей, предварительно ослабленных по иной причине.

При заражении туберкулёзом произойти может одно из двух:

- Иммунная система переборет бактерии и изолирует их – латентный туберкулёз. Если на более позднем этапе жизни иммунная система ослабнет, туберкулёз может перейти в активную форму.
- Бактерии будут размножаться и вызовут активный туберкулёз легких. Только 5-10% из всех зараженных заболевают активным туберкулёзом.

Туберкулёз заразен только при активной форме заболевания

- Заражение происходит при вдыхании бактерий туберкулёза. Инфекция передаётся капельным путём, то есть при нахождении вблизи кашляющего больного.
- Туберкулёз не особо заразен, поэтому наиболее уязвимы те, кто часто проводит с больным много часов в день.
- При наличии латентного туберкулёза, то есть присутствия бактерии без активной формы заболевания, человек не заразен.
- Не все больные туберкулёзом заразны. Дети редко бывают заразны. Заразны только больные с тяжелой формой туберкулёза легких. Люди с туберкулёзом других органов не заразны.

Симптомы туберкулёза

Самыми распространенными симптомами туберкулёза являются кашель, кровохарканье, повышение температуры, ночная потливость, одышка, общая усталость и потеря веса.

Если туберкулёзом поражены другие части тела, симптомы наблюдаются там. Например, опухшие лимфатические узлы, опухшие суставы, или боли в местах поражения.

Туберкулёз излечим

Туберкулёз подлежит медицинскому лечению. Активный туберкулёз лечится четырьмя различными видами антибиотиков, курс лечения длится полгода. *После 14-ти дней лечения пациент не заразен, и по окончании курса лечения бактерия вылечена.*

При латентной форме туберкулёза предлагается профилактическое лечение, снижающее риск перехода болезни в активную форму. Курс такого лечения длится от 3 до 6 месяцев.

Информация о туберкулёзе

Отслеживание туберкулёза

При лечении пациента с активным туберкулёзом, проводится отслеживание среды общения. Под отслеживанием среды общения подразумевается обследование контактов в ближайшей среде общения, которые могли быть подвергнуты инфекции или возможно быть источником инфекции заболевшего. Как правило, начинают с тестирования тесных контактов. Как правило, речь идёт о семье или других сожителях. В некоторых случаях также необходимо тестирование на местах работы, в школах или в других заведениях.